

# KONTROLNÍ SEZNAM PROVEDENÝCH VYŠETŘENÍ PRO PACIENTKY užívající perorální izotretinoin

Perorální izotretinoin je teratogenní. Existuje vysoké riziko narození dítěte s těžkou vrozenou vadou, pokud pacientka otěhotní během léčby izotretinoinem nebo jeden měsíc po jejím ukončení.

Izotretinoin je indikován pro těžké formy akné (jako je acne nodulocystica/conglobata nebo forem akné s rizikem trvalého jizvení) rezistentní k odpovídající standardní systémové a lokální terapii.

JMÉNO PACIETKY .....

VĚK PACIETKY .....

JE PACIETKA VE FERTILNÍM VĚKU?

ANO

NE nejsou nutná následující opatření

---

Pacientka byla poučena ústně i písemně o rizicích užívání perorálního izotretinoinu během těhotenství a o možných důsledcích expozice plodu účinkům perorálního izotretinoinu.

ANO

NE

---

Pacientka byla poučena ústně i písemně o nezbytnosti používat vhodnou antikoncepci (přínejmenším jednu metodu, přednostně dvě, z toho jednu bariérovou) bez přerušení jeden měsíc před zahájením léčby, v celém průběhu léčby a jeden měsíc po ukončení léčby perorálním izotretinoinem. Výjimkou je situace, kdy se lékař domnívá, že riziko těhotenství neexistuje.

ANO

NE

---

Je předpoklad, že se lze na pacientku spolehnout, že porozumí instrukcím a že je bude dodržovat.

ANO

NE

---

Pacientka byla vybíduta ptát se na cokoli, co se týká její léčby perorálním izotretinoinem nebo instrukcí týkajících se prevence otěhotnění a co by jí mohlo být nejasné.

ANO

NE

---

Pacientka porozuměla všem upozorněním týkajícím se léčby, což je ochotna potvrdit svým podpisem na formuláři „Informovaný souhlas s léčbou a antikoncepcí“.

ANO

NE

---

# KONTROLNÍ SEZNAM PROVEDENÝCH VYŠETŘENÍ PRO PACIENTKY užívající perorální izotretinoin

Pacientka užívá minimálně jeden měsíc před zahájením léčby perorálním izotretinoinem účinnou antikoncepci:

ANO

NE

Vhodné odeslat pacientku ke gynekologovi na poradu ohledně antikoncepce. Předepsání perorálního izotretinoinu je vhodné nejdříve jeden měsíc po nasazení účinné antikoncepce.

DATUM NÁVŠTĚVY	METODY ÚČINNÉ ANTIKONCEPCE	DATUM POSLEDNÍ MENSTRUACE	TĚHOTENSKÝ TEST	PODPIS PACIENTKY
První předepsání .....				
Ukončení terapie perorálním izotretinoinem				
5 týdnů po ukončení terapie .....				

Pozn.:

Těhotenský test z moče musí být proveden nejpozději v den nasazení izotretinoinu, nebo 3 dny před každým dalším předepsáním perorálního izotretinoinu a dále 5 týdnů po ukončení léčby perorálním izotretinoinem. Je doporučeno provedení těhotenských testů s minimální citlivostí 25 mIU/ml.